

濾胞性リンパ腫に対する O-CHOP療法(1コース目)

(ガザイバ+エンドキサン+ドキシソルビシン+オンコビン+プレドニン) DRPHW DRPHW

2025年03月25日 改訂

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 ＜＜SYPID＞＞	氏名 ＜＜ORIBP_KANJI＞＞	年齢 様＜＜SYAGE＞＞	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ～ ()	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		


Day1(/) Day8(/)

Day15(/)

《ガザイバ投与30分前に服用》

ポララミン錠	1錠	過敏反応
カロナール錠	500mg	防止の為

本管



※ガザイバ投与速度


最初の1時間
↓ () mL/hr
次の1時間
↓ () mL/hr
以後
↓ () mL/hr

全量
290mL

ガザイバの本管には生食を使用

Day2(/)

本管



内服薬

プレドニン錠

★1日 () mg

5日間 服用

O-CHOP療法(1コース目)

標準投与量:

O	1000 mg/body	day1,8,15
CPA	750 mg/m ²	day2
ADM	50 mg/m ²	day2
VCR	1.4 mg/m ²	day2
	(max:2mg/body)	
PSL	100 mg/body	day2-6

3週毎