

濾胞性リンパ腫に対する O-CVP療法(1コース目)

(ガザイバ+エンドキサン+オンコビン+プレドニン) DRPHW_DRPHW

2025年03月25日 改訂


Dr.sign		Ns.sign		Ph.sign		
病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(2日目)】			
			<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製			

Day1 (/) Day8 (/)

Day15 (/)

《ガザイバ投与30分前に服用》

ポララミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)




※ガザイバ投与速度

最初の1時間
↓ () mL/hr
次の1時間
↓ () mL/hr
以後
↓ () mL/hr

全量
290mL

Day2 (/)

本管



内服薬

プレドニン錠

★1日 () mg

5日間 服用

O-CVP療法(1コース目)

標準投与量:

O 1000 mg/body day1,8,15
CPA 750 mg/m² day2
VCR 1.4 mg/m² day2
(max:2mg/body)
PSL 100 mg/body day2-6
3週毎