

CD30陽性ホジキンリンパ腫に対するA-AVd(BV50mg以上)療法

アドセトリス+ダカルバジン+エクザール+ドキシソルピシン)DRPHW_DRPHW\

2018年11月05日 作成
2022年02月14日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示(初日)】		
	月	日 ~ ()	コース目	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(15日目)】		
				<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

※BV 50mg以上


Day1(/) ・ Day15(/)

本管

× ()

側管

ルートもアルミホイル
などで遮光



A-AVd療法

標準投与量:

Brentuximab	1.2 mg/kg	day1,15
ADM	25 mg/m ²	day1,15
VBL	6 mg/m ²	day1,15
	(max:10mg/body)	
DTIC	250 mg/m ²	day1,15

4週毎