

急性リンパ性白血病に対する Blinatumomab(1コース目)療法

(ビーリンサイト)

DRPHW_DRPHW_V

2019年01月10日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 ＜＜SYPID＞＞	氏名 ＜＜ORIBP_KANJI＞＞	年齢 様＜＜SYAGE＞＞	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		

Day 1 (/) ・ Day 8 (/)

Day 9 (/) ~ Day 28 (/)

ポートフラッシュ

デキサートとビーリンサイトのルート
は各々別にセットすること

(30min)

 生理食塩水 100mL
 デキサート6.6mg 2V
 デキサート3.3mg 1A
 (リン酸エステル換算 20mg)

 専用ルート
 10mL/hr
 (24hr)

 生理食塩水 270mL
 ビーリンサイト day1 μ g
 day8 μ g

※翌日つなぎ替え時残破棄

前日からの継続

 専用ルート
 10mL/hr
 (24hr)

 生理食塩水 270mL
 ビーリンサイト μ g

※翌日つなぎ替え時残破棄

※終了時ルート内の残液は破棄。

Day 2 (/) ~ Day 7 (/)

前日からの継続

 専用ルート
 10mL/hr
 (24hr)

 生理食塩水 270mL
 ビーリンサイト μ g

※翌日つなぎ替え時残破棄

※ルート変更時ルート内の残液は破棄

※ 延長チューブ(100cm 1.0mL)を専用ルートと接続。

※ ビーリンサイトは単独ルートで。側管禁。

※ つなぎ替えは原則AM10時。

※ ルートフラッシュ禁。

※ シャワー浴時はロック可。

(ルートロック時はロックのみ。フラッシュは禁。)

※ 1時間以内に再接続。

Blinatumomab(1コース目)療法

標準投与量:

 $Bw \geq 45kg$ Blinatumomab 9 μ g/body day1-7Blinatumomab 28 μ g/body day8-28 $BW < 45kg$ Blinatumomab 5 μ g/m² day1-7Blinatumomab 15 μ g/m² day8-28