

# 胃癌に対する XELOX+Trastuzumab療法

(オキサリプラチン+カペシタビン+トラスツズマブ) )RPHW\_DRPHW\

2017年01月17日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )		実施サイクル コース目	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1( / )夕 ~ Day15( / )朝

カペシタビン錠  
★1日量 mg  
※1回 錠 ( mg /回)  
を1日2回、14日間服用

初回Day1( / )

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用

本管

5%ブドウ糖 250mL

側管

開始時  
(15min)

グラニセロン1mg/生食50mL  
デキサート3.3mg 1A  
(リン酸エステル換算 4mg)

(2hr)

5%ブドウ糖 500mL  
オキサリプラチン mg

全開で

5%ブドウ糖 50mL

生理食塩水 100mL

全開で

生理食塩水 50mL

(90min)

生理食塩水 250mL  
トラスツズマブ mg

全開で

生理食塩水 50mL

以後、Day1

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用

本管

5%ブドウ糖 250mL

側管

開始時  
(15min)

グラニセロン1mg/生食50mL  
デキサート3.3mg 1A  
(リン酸エステル換算 4mg)

(2hr)

5%ブドウ糖 500mL  
オキサリプラチン mg

全開で

5%ブドウ糖 50mL

生理食塩水 100mL

全開で

生理食塩水 50mL

(45min)

生理食塩水 250mL  
トラスツズマブ mg

全開で

生理食塩水 50mL

Day2( / ) ~ Day3( / )

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 4錠を  
1日2回(朝昼食後)服用

XELOX+Trastuzumab療法

標準投与量:

L-OHP 130 mg/m<sup>2</sup> day1

Capecitabine 2,000 mg/m<sup>2</sup> day1-14

HCPT 6 mg/kg day1

(初回のみ8mg/kg)

3週毎