

大腸癌に対する IRIS(アイリス)療法

(S-1+イリノテカン)

DRPHW_DRPHW_\

2010年06月15日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1(/) ~ Day14(/)

エスワンタイハウ
★1日量 mg
を1日2回に分けて、14日間服用

【エスワンタイハウ初回基準1回量】

体表面積	初回基準量
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² ~1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回

※適宜増減

Day1(/) ・ Day15(/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

生理食塩水 500mL

(側管終了まで維持)

側管

開始時
(15min)

グラニセトロン1mg/生食50mL
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)

(2hr)

5%ブドウ糖 250mL
イリノテカン mg

全開で

生理食塩水 50mL

Day2(/) ~ Day3(/)

Day16(/) ~ Day17(/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

IRIS療法

標準投与量:

S-1 BSA<1.25m² 80 mg/day day1-14
1.25<BSA<1.5 m² 100 mg/day
BSA>1.5 m² 120 mg/day
CPT-11 125 mg/m² day1,15
4週毎