

大腸癌に対する IRIS+Cetuximab療法

(アービタックス+イリノテカン+S-1)

)RPHW_D RPHW_1

2012年12月11日 承認

2021年08月19日 改訂(第9版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 ＜＜SYPID＞＞	氏名 ＜＜ORIBP_KANJI＞＞	年齢 様＜＜SYAGE＞＞	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ～ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 ☐ 有 ☐ 無	【調製指示(2回目以降)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		

Day1(/) ~ Day14(/)

エスワンタイハウ

★1日量 mg

を1日2回に分けて、14日間服用

Day1(/) ・ Day15(/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

生理食塩水 500mL

(側管終了後、抜去可)

側管

開始時
(15min)

グラニセトロン1mg/生食50mL
ポラミン5mg 1A
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)

専用ルート
(初回2hr)
(以後1hr)

生理食塩水
アービタックス
{ 初回 mg
以後 mg

全量
初回
以後
mL
mL

(1hr)

生理食塩水 250mL

(2hr)

生理食塩水 500mL
イリノテカン mg

全開で

生理食塩水 50mL

【エスワンタイハウ初回基準1回量】

体表面積	初回基準量
1.25m ² 未満	40mg/回
1.25m ² ～1.5m ² 未満	50mg/回
1.5m ² 以上	60mg/回

※適宜増減

Day2(/) ・ Day3(/)

Day16(/) ・ Day17(/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

Day8(/) Day22(/)

本管

生理食塩水 500mL

(側管終了後、抜去可)

側管

(15min)

生理食塩水 100mL
ポラミン5mg 1A
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

専用ルート
(1hr)

生理食塩水 150mL
アービタックス mg

(1hr)

生理食塩水 250mL

IRIS/Cet療法

標準投与量:

Cetuximab 250(初回400) mg/m² day1,8,15,22CPT-11 100 mg/m² day1,15

S-1 80～120 mg/body day1～14 4週毎