

大腸癌に対する modified FOLFOX6療法

(レボホリナート+オキサリプラチン+フルオロウラシル) 1BPHW 1BPHW

2008年06月10日 承認

2024年08月30日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			☐ 有 ☐ 無			

Day1 (/)

本管(中心静脈ポート)

ルートを確保後、主管は止めること

生理食塩水 100mL

側管

開始時

(30min)

グラニセトロン1mg/生食50mL
アロカリス 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)

同時投与

(2hr)

5%ブドウ糖 250mL
レボホリナート mg

(2hr)

5%ブドウ糖	250mL
オキサリプラチン	mg

(全開でdiv)
(2分程度で)

生理食塩水 20mL※
フルオロウラシル mg

※50mLの容器から
30mLを破棄

(全開でdiv)

生理食塩水 50mL

(46hr)

生理食塩水 140 mL
フルオロウラシル mg
★全量140mLに調製

(インフューザーポンプを使用)

終了後に自己抜針

(初回は本人及び家族に指導し、自己抜針してもらう)

Day2(/) ~ Day3(/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

modifiedFOLFEX6療法

標準投与量:

I-LV	200 mg/m ²	day1
------	-----------------------	------

L-OHP 85 mg/m² day1

5-FU 400 mg/m² (bolus)

5-FU 2,400 mg/m² (46hr持続)

2週毎