

大腸癌に対する FOLFIRI+aflibercept療法

(レボホリナート+イリノテカン+フルオロウラシル+ザルトラップ) (RPHW_DRPHW_)

2018年01月15日 承認
2024年08月30日 改訂

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		


Day1 (/)

本管(中心静脈ポート)

生理食塩水 100mL

ルート確保後、主管は止めること

側管



終了後に自己抜針

(初回は本人及び家族に指導し、自己抜針してもらう)

Day2 (/) ~ Day3 (/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

FOLFIRI+aflibercept療法

標準投与量:

aflibercept	4 mg/kg	day1
I-LV	200 mg/m ²	day1
CPT-11	150 mg/m ²	day1
5-FU	400 mg/m ²	(bolus)
5-FU	2,400 mg/m ²	(46hr持続)

2週毎