

Ewing肉腫に対するIE療法

(エトポシド+イホマイド)

)RPHW_)RPHW_)

2020年07月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(2日目以降)】			
			□調製可 □TEL連絡後調製			

Day1 (/) ~ Day5 (/)

本管

生理食塩水 1000mL

(24hr)

側管1

グラニセトロン1mg/生食50mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

(15min)

専用ルート

(3h)

生理食塩水 500mL
エトポシド mg

(3h)

生理食塩水 500mL
イホマイド mg

全開で

(i.v.)

生理食塩水 50mL

フロセミド 1A

(2h)

ソルデム3A 500mL

×3

側管2

(30min)

生理食塩水 50mL
ウロミテキサン 800 mg

×3

(イホマイド投与時,4時間後,8時間後)

Day6 (/)

本管

ソルデム3A 500mL

×8

(24hr)

- ・尿量毎時100mL、1日3,000mL以上を保つ。
- ・尿pH7.0以上に保つ。

Day1 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

Day2 (/) ~ Day5 (/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

※VDC療法と交互に施行

フィルター付きCSTDを使用
物品は14階病棟より取り寄せ

IE療法

標準投与量:

VP-16	100 mg/m ²	day1-5
IFO	1,800 mg/m ²	day1-5
Mesna	2,400 mg/body	day1-5

3週毎