

多発性骨髄腫に対する IsaPd療法【75歳以上】(2コース目以降)

(サークリサ+ポマリスト+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW_V

2020年8月24日 承認
2021年12月22日 改訂(第3版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》 様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 0.00 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(15日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

内服薬

ポマリストカプセル

★1日 mg

21日間 服用

Day1(/) Day15(/)


《サークリサ投与30分前に服用》

カロナール錠 1000mg (過敏反応防止の為)

本管

側管

←サークリサの本管には生食かブドウ糖液を使用



day1.15

※サークリサ投与速度

0 - 1時間
↓ () mL/hr
1時間 - 1時間30分
↓ () mL/hr
以後30分毎2時間で速度調整
↓ () mL/hr

Day8(/) Day22(/)

デカドロン錠 mg

レナデックス錠 mg

IPd療法(2コース目以降)

標準投与量:

Isatuximab 10 mg/kg day 1.15
Dexa 20 mg/body day 1.8.15.22
Pomalido 4 mg/body day1-21
4週毎