多発性骨髄腫に対する DKd療法(1サイクル目)

(ダラザレックス+カイプロリス+デキサメタゾン)

	(.	ダフサレツクスコ	- カイノロ・	/AT /	イリノブ .)RPF	HW_DRPHW_\
2021年4月19日 承認		Dr.sign		Ns.sign		Ph.sign		
病棟・科名 登録番号	氏名		年齢	į	身長	体重	ᄸ	表面積
< <sypid></sypid>	>> < <or< td=""><td>RIBP_KANJI>></td><td>· 様 <<sy< td=""><td>'AGE>></td><td></td><td>cm</td><td>kg</td><td>m^2</td></sy<></td></or<>	RIBP_KANJI>>	· 様 < <sy< td=""><td>'AGE>></td><td></td><td>cm</td><td>kg</td><td>m^2</td></sy<>	'AGE>>		cm	kg	m^2
疾患名 施行	 			<mark></mark> 『施サイク	ブル	 【調製指示(?	<mark>-</mark> 初日~2	
	月	□ ~()	コース目					車絡後調製
構考[標準投与量逸脱など				<u> </u>	一ス予定	【調製指示(
								連絡後調製
Day8(/) [Day22(/)	過敏反応防止 Day2(/ Day15(/ Day15(/ Day15(/ Day15(/ Day15(/ Day15(/ Day15)	(Day1,2) (Day8.15) (Day8.15) (Day8.15)	2時間	(30m (30m 全開 (30m 事用ル 全開	in) で	プロリス ・	00mL g 2V g 1A I 20mg 0mL mg 50mL 1A g 5V I 40mg 00mL mg	day1,2 day 8,15,22
□ダラザレックス初回(Day1)投 □輸血検査室へ投与開		則定 ↓	(<mark>)</mark>)ı 間以降	mL/hr mL/hr			ng/m ²	day8,9,15,16 4週毎