

急性骨髄性白血病に対する Azacitidine療法(皮下注)

(アザシチジン)

DRPHW_DRPHW_

2017年04月17日 作成

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------|---|----------|------------------------|
| 病棟・科名 | 登録番号 《《SYPID》》 | 氏名 《《ORIBP_KANJI》》 様 | 年齢 《《SYAGE》》 | 身長 cm | 体重 kg | 体表面積 m ² |
| 疾患名 | 施行予定日 月 日 ~ () | 実施サイクル コース目 | コース予定 | 【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 | | |
| 備考[標準投与量逸脱など] | | | | 【調製指示(2日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 | | |

Day 1 (/) ~ Day 7 (/)

皮下注

アザシチジン mg

※ 注射部位反応に注意

※ 使用前には必ず振盪すること

治療開始30分前にグラニセトロンゼリー 1包 内服

※ アザシチジンは常温で 30分以内 に必ず投与終了する

Azacitidine療法

標準投与量:

Azacitidine 75 mg/m² day1-7
4週毎