

再発・難治性末梢性T細胞リンパ腫に対するPralatrexate療法

(ジフォルタ)

DRPHW_DRPHW_1

2021年04月01日 改訂(第2版)

2018年01月22日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》 様	年齢 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

【必須項目】

- 投与10日以上前からパンビタン末2g 1×服用開始
- 初回投与の少なくとも10日前にプレスミンS注 1A筋注

Day1(/) Day8(/) Day15(/)
Day22(/) Day29(/) Day36(/)

本管



Day2(/) Day9(/) Day16(/)
Day23(/) Day29(/) Day36(/)

<ジフォルタ投与翌日より内服開始>

ロイコボリン5mg錠
★1日量 75 mg
を1日3回に分けて、3日間服用

【確認項目】

- 8-10週に1回の間隔でプレスミンS注 1A筋注

Pralatrexate療法

標準投与量:

Pralatrexate 30 mg/m²
day1,8,15,22,29,36
7週毎