化学療法計画書 GDTX002011-14　　□薬剤部提出用　□患者様説明用

乳癌に対する TC＋HCPT療法

（ドセタキセル＋エンドキサン＋トラスツズマブ）

)RPHW_)RPHW_\

2018年07月23日 承認
2024年11月07日 改訂

Dr.sign　　Ns.sign　　Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m^2

疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示（初日）】
	月 日 ～（ ）コース目	コース予定	□調製可 □TEL連絡後調製
備考[標準投与量逸脱など]		放射線併用 □有 □無	【調製指示（2回目以降）】 □調製可 □TEL連絡後調製

初回Day1（ / ）

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg　1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

生理食塩水 100mL

側管

CSTDを使用

(15min) グラニセトロン1mg/生食50mL
デキサート6.6mg 1V
（リン酸エステル換算 8mg）

(1hr) 5%ブドウ糖 250mL
ドセタキセル ＿＿＿ mg

(30min) 5%ブドウ糖 100mL
エンドキサン ＿＿＿ mg

(90min) 生理食塩水 250mL
トラスツズマブ ＿＿＿ mg

(1hr) 生理食塩水 100mL

初回Day2（ / ） ～ Day3（ / ）

《治療翌日より服用》

アプレピタントカプセル80mg　1回 1Cを
午前中（朝食後）に服用

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠　1回 4錠を
1日2回（朝昼食後） 服用

以後、Day1

本管

生理食塩水 100mL

側管

CSTDを使用

(15min) グラニセトロン1mg/生食50mL
デキサート6.6mg 1V
（リン酸エステル換算 8mg）

(1hr) 5%ブドウ糖 250mL
ドセタキセル ＿＿＿ mg

(30min) 5%ブドウ糖 100mL
エンドキサン ＿＿＿ mg

(45min) 生理食塩水 250mL
トラスツズマブ ＿＿＿ mg

全開で 生理食塩水 50mL

《治療翌日より服用》

アプレピタントカプセル80mg　1回 1Cを
午前中（朝食後）に服用

《治療翌日より2日間服用》

デカドロン錠　1回 4錠を
1日2回（朝昼食後） 服用

TC＋HCPT療法

標準投与量:

DTX	75	mg/m^2	day1
CPA	600	mg/m^2	day1
HCPT	6	mg/kg	day1

（初回のみ8mg/kg）

3週毎