

多発性骨髄腫に対する DBd(s.c)療法(4~8サイクル目)

(ダラキューロ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン)

DRPHW_DRPHW_1

2021年07月19日 承認
2022年11月09日 改訂(第3版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 様《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(4日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/)

《ダラキューロ投与1~3時間前に服用》

カロナール錠(500) 2T
モンテルカスト錠(10) 1T 過敏反応防止のため
ポララミン錠(2) 2T

点滴治療の場合(ダラキューロ投与前に施行)
本管



内服治療の場合

レナデックス
★1日 mg
ダラキューロ投与1~3時間前(朝食後でも可)に服用

皮下注(約3~5分かけて)

ダラキューロ配合皮下注 1800 mg (15mL)

※ デキサート投与終了後に皮下注
※ 全量【15.5mL】で払出し(15mL使用)

Day2 (/) Day4 (/)
Day5 (/) Day8 (/)
Day9 (/) Day11 (/)
Day12 (/)

レナデックス

★1日 mg

服用

Day1 (/) Day4 (/)
Day8 (/) Day11 (/)

皮下注

ボルテゾミブ mg

※ 注射部位反応に注意

DBd(s.c)療法(4~8サイクル目)

標準投与量:

Daratumumab 1800 mg/body day 1
Dexa 20 mg/body day 1,2,4,5,8,9,11,12
Bortezomib 1.3 mg/m² day 1,4,8,11
3週毎