

# 多発性骨髄腫に対する DKd(s.c)療法(1サイクル目)

(ダラキューロ+カイクロリス+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2021年7月19日 承認  
2022年11月09日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》様	年齢 《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1( / ) Day8( / ) Day15( / ) Day22( / )

## 《ダラキューロ投与1~3時間前に服用》

カロナル錠(500) 2T  
モンテルカスト錠(10) 1T 過敏反応防止のため  
ポララミン錠(2) 2T

## 皮下注(約3~5分かけて)

ダラキューロ配合皮下注 1800 mg (15mL)

※ カイクロリス投与日はカイクロリス終了後に皮下注


※ カイクロリス未投与日はデキサート終了後に皮下注

※ 全量【15.5mL】で抽出し(15mL使用)

Day1( / ) Day2( / )

本管

側管




Day22( / )

点滴治療の場合(ダラキューロ投与前に施行)

本管

側管



内服治療の場合

レナデックス

★1日 (mg)


ダラキューロ投与1~3時間前(朝食後でも可)に服用

Day8( / ) Day15( / )

Day9( / ) Day16( / )

本管

側管



### 【Dr必須項目】

- ダラキューロ初回(Day1)投与前に不規則抗体測定
- 輸血検査室へ投与開始日の連絡

### DKd(s.c)療法(1サイクル目)

#### 標準投与量:

Daratumumab 1800 mg/body day1,8,15,22

Dexa 40 mg/body/week

day 1,2,8,9,15,16,22

Carfiluzomib 20 mg/m<sup>2</sup> day1,2

56 mg/m<sup>2</sup> day8,9,15,16

4週毎