

# 多発性骨髄腫に対する DKd(s.c)療法(3~6サイクル目)

(ダラキューロ+カイクロリス+デキサメタゾン)

DRPHW\_DRPHW\_1

2021年7月19日 承認  
2022年11月09日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《SYPID》	氏名 《ORIBP_KANJI》	年齢 様《SYAGE》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ( )	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日~2日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(8日目以降)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1( / )

Day15( / )

## 《ダラキューロ投与1~3時間前に服用》

カロナル錠(500) 2T  
モンテルカスト錠(10) 1T 過敏反応防止のため  
ポララミン錠(2) 2T

## 皮下注(約3~5分かけて)


ダラキューロ配合皮下注 1800 mg (15mL)

- ※ カイクロリス投与日はカイクロリス終了後に皮下注
- ※ カイクロリス未投与日はデキサート終了後に皮下注
- ※ 全量【15.5mL】で払出し(15mL使用)

Day1( / ) Day2( / )

Day8( / ) Day9( / )

Day15( / ) Day16( / )




Day22( / )

点滴治療の場合

本管

側管



内服治療の場合

レナデックス

★1日          mg

服用

DKd(s.c)療法(3-6サイクル目)

### 標準投与量:

Daratumumab 1800 mg/body day1,15  
Dexa 40 mg/body/week  
day 1,2,8,9,15,16,22  
Carfiluzomib 56 mg/m<sup>2</sup>  
day 1,2,8,9,15,16

4週毎