

精巣腫瘍に対する BEP療法

(ブレオ+エトポシド+シスプラチン)

)RPHW、)RPHW、

2025年06月05日 改訂(第11版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	コース予定	【調製指示(初日)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		
	月 日 ~ ()コース目			【調製指示(2日目~5日目)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]	放射線併用	【調製指示(9日目、16日目)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製				
	☐ 有 ☐ 無					

Day 1 (/)

《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル 125mg 1カプセル

Day2 (/) ~ Day5 (/)

《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

Day1 (/) ~ Day5 (/)

ビカナイト 500mL 本管

(2hr)

側管
グラニセロン 1mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

(30min)

ソルデム3A 500mL × 2

(8hr)

(30min) マンニトール 300mL

(30min)

遮光

(2hr)

生理食塩水 250 mL★
シスプラチン mg
★全量250mLに調製(注)

専用ルート

(2hr)

生理食塩水 500mL
エトポシド mg(30min) 生理食塩水 100mL
ブレオ 30mg

※day2のみ

全開で

生理食塩水 50mL

ビカナイト 500mL

翌朝まで持続

Day 9 (/) Day16 (/)

生理食塩水 100mL 本管

(15min)

側管
生理食塩水 50mL
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)

(30min)

生理食塩水 100mL
ブレオ 30mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

← 1コース →

	1週目						2週目			3週目		
day	1	2	3	4	5	…	8	9	…	15	16	…
CDDP	○	○	○	○	○							
VP-16	○	○	○	○	○							
BLM	○						○			○		

BEP療法

標準投与量:

CDDP 20 mg/m² day1-5VP-16 100 mg/m² day1-5

BLM 30 mg/body day2,9,16

4週毎(3-4コース)