

婦人科悪性腫瘍に対する para-CP療法 (CBDCA+CPA)

(カルボプラチン+エンドキサン) RPHW_D RPHW_L

2021年11月01日 改訂(第8版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様 《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()		実施サイクル コース目	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]						

Day1 (/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

ソルアセットD 500mL

(側管終了まで維持) 側管

開始時

(30min)

パロノセトロン 0.75mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

(1h)

生理食塩水 250mL
エンドキサン mg

(1h)

5%ブドウ糖 250mL
カルボプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

Day2 (/) ~ Day3 (/)

《治療翌日より服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

para-CP療法

標準投与量:

CBDCA AUC=5 day1

CPA 500 mg/m² day1

3-4週毎