

子宮頸癌、子宮内膜癌、卵巣癌に対する TC療法(PTX+CBDCA)
(パクリタキセル+カルボプラチン) RPHW_DRPHW_1

2008年07月08日 承認
2025年04月04日 改訂

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製			
アルコール過敏症	備考[標準投与量逸脱など]					
☐ なし ☐ あり(慎重投与)						

Day1 (/)

《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

生理食塩水 500mL

(側管終了まで維持)

側管

開始時
(10min)

生理食塩水 50mL
ファモチジン20mg 1A
ポララミン5mg 1A
デキサート6.6mg 2V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 20mg)

(30min)

パロノセトロン 0.75mg/50mL

専用ルート
(3hr)

5%ブドウ糖 500mL
パクリタキセル mg

(1hr)

生理食塩水 250mL
カルボプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了抜去

Day2 (/) ~ Day3 (/)

《治療翌日より服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	☐ Cockcroft-Gault
☐ 補正あり	☐ Jelliffe
☐ 補正なし	☐ 24hrCcr
	☐

TC療法

標準投与量:

CBDCA AUC=4-6 day1
PTX 175 mg/m² day1
3週毎