

頭頸部癌に対するCetuximab+CBDCA+5-FU療法

(アービタックス+カルボプラチン+5-FU)

)RPHW_)RPHW_)

2013年03月11日 作成

2021年11月01日 改訂(第6版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 ＜＜SYPID＞＞	氏名 ＜＜ORIBP_KANJI＞＞	年齢 ＜＜SYAGE＞＞	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ～ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用 ☐ 有 ☐ 無	【調製指示(2回目以降)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		


Day1(/)

Day 2(/) ～ Day 4(/)

本管

ソルデム3A 1,000mL

側管




使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	☐ Cockcroft-Gault
☐ 補正あり	☐ Jelliffe
☐ 補正なし	☐ 24hrCcr
	☐

本管

ソルデム3A 1,000mL

側管




Day 8(/) ・ Day15(/)

本管

生理食塩水 500mL

側管



Cetuximab+CBDCA+5-FU療法

標準投与量:

Cetuximab 250 mg/m² day1,8,15
(初回のみ400mg/m²)

CBDCA

AUC =5

day1

5-FU

1000 mg/m²

day1-4,

3週毎