

頭頸部癌に対する CDDP動注療法

(シスプラチン)

)RPHW、)RPHW、

2021年08月26日 改訂(第5版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 ＜＜SYPID＞＞	氏名 ＜＜ORIBP_KANJI＞＞	年齢 様＜＜SYAGE＞＞	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ～ ()	実施サイクル コース目	コース予定	動注化学療法 放射線併用		
備考[標準投与量逸脱など]						

Day1(/) Day8(/) Day22(/) Day29(/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

腫瘍栄養血管より動注する

造影用 インジコカルミン 20mg 1A

《動注》

シスプラチン

mg
メイロン 7% 20 mL

10mL/minの速度で動注

本管(静注ライン)

ラクテック 500mL

ルート確保用

側管

(15min)

グラニセトロン1mg/生食50mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

以降造影室にて

動注開始

15分前

(6hr)

生理食塩水 500 mL
デトキソール10% mL

シスプラチン動注

動注終了後帰室

(i.v.)

フロセミド20mg 1A

ソルデム3A 1500mL

(12hr)

デトキソール10%
全量500mLに調製
余剰の生食は破棄
CDDP10mgにつき
デトキソール20mL使用

Day2(/) Day9(/)

Day23(/) Day30(/)

Day3(/) Day10(/)

Day24(/) Day31(/)

《治療翌日より服用》

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

本管

※前日主管のつなぎ替え

ソルデム3A 2000mL

(24hr)

CDDP動注療法

標準投与量:

CDDP 100 mg/m² day1,8
day22,29