

Ewing肉腫に対するVDC療法

(オンコビン+ドキソルビシン+エンドキサン)

)RPHW_D)RPHW_1

2020年07月20日 承認
2021年11月01日 改訂(第2版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]						

Day1(/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

ソルデム3A 500ml × 5

(15hr)

側管1

(15min)

パロノセトロン 0.75mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

(1h)

生理食塩水 100mL
ドキソルビシン mg

(3h)

生理食塩水 500mL
エンドキサン mg

(10min)

生理食塩水 50mL
オンコビン mg

全開で

生理食塩水 50mL

側管2

(30min)

生理食塩水 50mL
ウロミテキサン 800 mg × 3

(エンドキサン投与直後,4時間後,8時間後)

Day2(/) Day3(/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

本管

ソルデム3A 500mL × 8

(24hr)

・尿量毎時100mL、1日3,000mL以上を保つ。
・尿pH7.0以上に保つ。

VDC療法

標準投与量:

ADM	75 mg/m ²	day1
CPA	1,200 mg/m ²	day1
VCR	1.25 mg/m ²	day1
	(max:2mg/body)	
Mesna	2400 mg/body	day1

3週毎

※IE療法と交互に施行

※ADMが総量375mg/m²に達したとき
はVDC(ACT-D)へ変更