

食道癌に対する FP療法(＋Radiation)(5-FU＋CDDP)

(フルオロウラシル＋シスプラチン) RPHW_RPHW_1

2022年02月14日 改訂(第12版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 ＜＜SYPID＞＞	氏名 ＜＜ORIBP_KANJI＞＞	年齢 様＜＜SYAGE＞＞	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ～ ()	実施サイクル コース目	コース予定	【調製指示(初日)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2日目以降)】 ☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		

Day1(/)

本管

ソルデム3A 1,000mL ※混注不可
ビカネイト 1,000mL

側管1

(24hr維持) 全開で 生理食塩水 50mL
(24hr維持) 生理食塩水 250mL
フルオロウラシル mg

側管2

(2hr) ラクテック 500mL
全開で 生理食塩水 50mL
開始時 (30min) パロノセトロン 0.75mg/50mL
プロイメンド 1V
デキサート6.6mg 1A
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

遮光 (2hr) 生理食塩水 300mL
シスプラチン mg

全開で 生理食塩水 50mL

(i.v.) フロセミド 1A

全量 mL

Day2(/) ~ Day3(/)

本管

ソルデム3A 1,000mL ※混注不可
ビカネイト 1,000mL

側管1

(24hr維持) 生理食塩水 250mL
(24hr維持) フルオロウラシル mg

側管2

(30min) 生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

午前中に

Day4(/)

本管

ソルデム3A 1,000mL ※混注不可

側管1

(24hr維持) 生理食塩水 250mL
(24hr維持) フルオロウラシル mg

全開で 生理食塩水 50mL

側管2

(30min) 生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

午前中に

FP(+Radiation)療法

標準投与量:

5-FU 700 mg/m² day1-4CDDP 70 mg/m² day1

4-5週毎(術前は3週毎)