

大腸癌に対する CAPOX療法

(オキサリプラチン+カペシタビン)

DRPHW_DRPHW_1

2010年01月12日 承認
2022年03月18日 改訂(第13版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示】	
	月	日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
備考[標準投与量逸脱など]						

Day1 (/)

《治療当日・治療前》

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

5%ブドウ糖 250mL

側管

開始時 (15min)
グラニセトロン1mg/生食50mL
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)

←

(2hr)
5%ブドウ糖 500mL
オキサリプラチン mg

←

全開で
5%ブドウ糖 50mL
ルートフラッシュ後 破棄可

←

Day1 (/) 夕 ~ Day15 (/) 朝

内服薬

カペシタビン錠

★1日量 mg

※1回 錠 (mg / 回)
を1日2回、14日間服用

【カペシタビン初回基準1回量】

体表面積	初回基準量
1.36m ² 未満	1,200mg/回
1.36m ² ~1.66m ² 未満	1,500mg/回
1.66m ² ~1.96m ² 未満	1,800mg/回
1.96m ² 以上	2,100mg/回

※適宜増減

Day2 (/) ~ Day3 (/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

CAPOX療法

標準投与量:

L-OHP 130 mg/m² day1
Capecitabine 1,000 mg/m² × 2回 day1-14
3週毎