

胸腺腫瘍に対する ADOC療法(CDDP+ADM+VCR+CPA)

(スプラチン+ドキソルビシン+オンコビン+エンドキサン) RPHW_ORPHW_W

2015年02月16日 承認
2022年02月09日 改訂(第5版)

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]	放射線併用	【調製指示(day 3, 4)】				
	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製				

Day1 (/)

《点滴開始時に服用》

アプレピタントカプセル 125mg 1カプセル

本管

ソルデム3A 1,500mL 側管

(6 hr)

パロノセトロン 0.75mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(30 min)

生理食塩水 100mL
ドキソルビシン mg

(30 min)

生理食塩水 50mL

全開で

マンニトール 300mL

(1.5 hr)

遮光 生理食塩水 300mL
シスプラチン mg

(2 hr)

生理食塩水 50mL

全開で

終了後へパロック

Day2 (/)

《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

本管

ソルデム3A 1,500mL 側管

(6 hr)

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 1V

(30 min)

マンニトール 300mL

(1.5 hr)

終了後へパロック

Day3 (/)

《朝食後に服用》

アプレピタントカプセル 80mg 1カプセル

本管

ソルデム3A 1,500mL 側管

(6 hr)

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 1V

(30 min)

生理食塩水 50mL
オンコビン mg

(10 min)

生理食塩水 50mL

全開で

マンニトール 300mL

(1.5 hr)

Day2は終了後へパロック

Day4 (/)

本管

ソルデム3A 500mL 側管

(2 hr)

生理食塩水 50mL

全開で

グラニセトロン1mg/生食50mL
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

(30 min)

生理食塩水 500mL
エンドキサン mg

(2 hr)

生理食塩水 50mL

全開で

Day5 (/) ~ Day6 (/)

**デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用**

ADOC療法

標準投与量:

CDDP	50 mg/m ²	day1
ADM	40 mg/m ²	day1
VCR	0.6 mg/m ²	day3
CPA	700 mg/m ²	day4 (3週毎)
