化学療法計画書 BIKd001003-4　　　　□薬剤部提出用　□患者様説明用

多発性骨髄腫に対する　IsaKd療法（2サイクル目以降）

（サークリサ＋カイプロリス＋デキサメタゾン）

RPHW_DRPHW_

2022年1月17日　承認　　　Dr.sign　　　Ns.sign　　　Ph.sign

病棟・科名	登録番号 <<SYPID>>	氏名 <<ORIBP_KANJI>>　様	年齢 <<SYAGE>>	身長 cm	体重 kg	体表面積 m^2

疾患名	施行予定日 月　日 ～（　）コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示（初日）2日目は調整可】 □ 調製可　□ TEL連絡後調製 【調製指示（8日目）9日目は調整可】 □ 調製可　□ TEL連絡後調製 【調製指示（15日目）16日目は調整可】 □ 調製可　□ TEL連絡後調製
備考[標準投与量逸脱など]			

Day1（　/　）　Day15（　/　）

《サークリサ投与30分前に服用》

カロナール錠 1000mg （過敏反応防止の為）

本管　　側管

- （30min）：生理食塩水 100mL／ガスター20mg 1A／ポララミン5mg 1A／デキサート6.6mg 2V／デキサート3.3mg 1A／（リン酸エステル換算 20mg）
- 専用ルート ※：生理食塩水 **250** mL／サークリサ　mg
- 全開で：生理食塩水 50mL
- （30min）：5%ブドウ糖 50mL／カイプロリス　mg
- 全開で：生理食塩水 50mL

Day2（　/　）　Day8（　/　）
Day9（　/　）　Day16（　/　）

本管　　側管

- （30min）：生理食塩水 100mL／デキサート6.6mg 2V／デキサート3.3mg 1A／（リン酸エステル換算 20mg）
- （30min）：5%ブドウ糖 50mL／カイプロリス　mg
- 全開で：生理食塩水 50mL

day1.15

※サークリサ投与速度

0 － 1時間
↓（　）mL/hr
1時間－1時間30分
↓（　）mL/hr
以後30分毎2時間で速度調整
↓（　）mL/hr

Day22（　/　）

□ **点滴治療の場合**

本管　　側管

- （30min）：生理食塩水 100mL／デキサート6.6mg 5V／（リン酸エステル換算 40mg）

□ **内服治療の場合**

レナデックス
★1日　　mg
服用

IsaKd療法(2サイクル目以降)

標準投与量：

Isatukisimab	10 mg/kg	day1,15
Dexa	40 mg/body/week	day 1,2,8,9,15,16,22
Carfiluzomib	56 mg/m^2	day1,2,8,9,15,16

4週毎