

# 胆道癌に対する GC+Durvalumab療法

(ゲムシタビン+シスプラチン+イミフィンジ)

DRPHW\_DRPHW\_1

2023年03月20日 承認  
2024年06月24日 改訂(第2版)


Dr.sign

Ns.sign


Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m <sup>2</sup>
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示(初日)】	
	月	日 ~ ( )	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]					【調製指示(Day8)】	
					<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	

Day1 ( / )



Day8 ( / )



※ ゲムシタビンは投与時間厳守！！

※ 尿量が少なき場合はフロセミドの使用を検討すること。

※ イミフィンジ: 30kg以下の場合は20mg/kg

GC+Durvalumab療法

標準投与量:

CDDP 25 mg/m<sup>2</sup> day1,8

GEM 1000 mg/m<sup>2</sup> day1,8

Durvalumab 1500 mg/body day1

※30kg以下の場合は20mg/kg 3週毎