

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する エプキンリ療法(1サイクル目)

(Epcoritamab)

RPHW_RPHW_1

2023年11月27日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》 様	年齢 《《SYAGE》》	身長	体重 cm kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル	コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 【調製指示(8日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 【調製指示(15日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 【調製指示(22日目)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]						

Day1(/)

《エプキンリ投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T
ポララミン錠(2) 1T

皮下注

エプキンリ皮下注 **0.16** mg
液量 1mL

Day8(/)

《エプキンリ投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T
ポララミン錠(2) 1T

皮下注

エプキンリ皮下注 **0.8** mg
液量 1mL

Day15(/) Day22(/)

《エプキンリ投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T
ポララミン錠(2) 1T

皮下注

エプキンリ皮下注 **48** mg
液量 0.8mL

Day1(/) ~ Day4(/)

Day8(/) ~ Day11(/)

Day15(/) ~ Day18(/)

Day22(/) ~ Day25(/)

内服薬(サイトカインストーム予防として)

プレドニン錠

★1日 100 mg

皮下注当日から 4日間 服用

※ 皮下注当日は
エプキンリ投与60分前に服用

Epcoritamab療法(1サイクル目)

標準投与量:

Epcoritamab 0.16 mg/body day 1
0.8 mg/body day 8
48 mg/body day 15.22
4週毎