

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する エプキンリ療法(1サイクル目)2ステップ^o漸増
(Epcoritamab)

DRPHW DRPHW

2023年11月27日 承認
2024年04月23日 改訂

Dr.sign		Ns.sign		Ph.sign		
病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示(初日)】	
	月	日 ~ ()	コース目	コース予定	□調製可 □TEL連絡後調製	
備考[標準投与量逸脱など]					【調製指示(8日目)】	
					□調製可 □TEL連絡後調製	
					【調製指示(15日目)】	
					□調製可 □TEL連絡後調製	
					【調製指示(22日目)】	
					□調製可 □TEL連絡後調製	

Day1(/ /)

《エプキンリ投与60分前に服用》

カロナール錠(500)	2T
ポララミン錠(2)	1T

皮下注

エプキンリ皮下注	0.16 mg
液量	1mL

Day8(/ /)

《エプキンリ投与60分前に服用》

カロナール錠(500)	2T
ポララミン錠(2)	1T

皮下注

エプキンリ皮下注	0.8 mg
液量	1mL

Day15(/ /) Day22(/ /)

《エプキンリ投与60分前に服用》

カロナール錠(500)	2T
ポララミン錠(2)	1T

皮下注

エプキンリ皮下注	48 mg
液量	0.8mL

Day1(/ /) ~ Day4(/ /)

Day8(/ /) ~ Day11(/ /)

Day15(/ /) ~ Day18(/ /)

Day22(/ /) ~ Day25(/ /)

【サイトカインストーム予防】

□ 内服治療の場合

デカドロン
★1日 15 mg
皮下注射当日はエプキンリ投与60分前

□ 点滴治療の場合(エプキンリ投与前に施行)

本管 側管

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 2V
(リン酸エステル換算 16mg)

(60min)

注意!! (指示ではないため主治医に指示確認要)

℃以上の発熱が認められた場合医師に

mg / ml

のアクテムラ入力依頼。(セット入力より)

★皮下注部位

腹部・大腿部

Epcoritamab療法(1サイクル目)

標準投与量:

Epcoritamab	0.16 mg/body day 1
	0.8 mg/body day 8
	48 mg/body day 15.22
	4週毎