

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する エプキンリ療法(4-9サイクル目)

(Epcoritamab)

)RPHW_DRPHW_)

2023年11月27日 承認

2024年04月23日 改訂

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	□ 調製可 □ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(15日目)】			
			□ 調製可 □ TEL連絡後調製			

Day1(/) Day15(/)

皮下注

エプキンリ皮下注 48 mg

液量 0.8mL

★皮下注部位

腹部・大腿部

【Dr必須項目】

前回投与時のサイトカインストーム

- ☐ グレード1:ステロイド不要(レジメンセットから削除)
- ☐ グレード2-3: day1-4にステロイドを投与

Day1(/) ~ Day4(/)

Day15(/) ~ Day18(/)

【サイトカインストーム予防】

□ 内服治療の場合

デカドロン

★1日 15 mg

皮下注射当日はエプキンリ投与60分前

□ 点滴治療の場合(エプキンリ投与前に施行)

本管

側管

生理食塩水 100mL
デキサート6.6mg 2V
(リン酸エステル換算 16mg)

(60min)

注意!! (指示ではないため主治医に指示確認要)

℃以上の発熱が認められた場合医師に

mg / ml

のアクテムラ入力依頼。(セット入力より)

Epcoritamab療法(4-9サイクル目)

標準投与量:

Epcoritamab 48 mg/body day 1.15
4週毎