

乳癌に対する PER+HER (s.c) 療法 (フェスゴ皮下注)

(フェスゴ皮下注)

)RPHW_DRPHW_1

2024年01月15日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 《《SYPID》》	氏名 《《ORIBP_KANJI》》	年齢 様《《SYAGE》》	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示(初日)】 <input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

Day1 (/)

2mL/min以下の速度で
皮下注(8分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 IN (15mL)

※ 投与後 30分 経過観察

2コース目以降、Day1

2mL/min以下の速度で
皮下注(5分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 MA (10mL)

※ 投与後 30分 経過観察

※ インフュージョンリアクションない場合

⇒ 投与後 15分 経過観察 まで短縮可

※ 翼状針 禁!

※ 22-27Gの注射針で投与

※ 大腿部に

PER+HER(s.c)療法:フェスゴ配合皮下注

標準投与量:

PER 600 mg/body day1
(初回のみ1200mg/body)

HER 600 mg/body day1

3週毎