

## 小細胞肺癌に対する CBDCA+AMR療法

(カルボプラチン+カルセド)

)RPHW、)RPHW、\

2009年12月08日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

|               |           |                 |                |                |    |                |
|---------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----|----------------|
| 病棟・科名         | 登録番号      | 氏名              | 年齢             | 身長             | 体重 | 体表面積           |
|               | <<SYPID>> | <<ORIBP_KANJI>> | 様 <<SYAGE>>    | cm             | kg | m <sup>2</sup> |
| 疾患名           | 施行予定日     | 実施サイクル          | 【調製指示(初日)】     |                |    |                |
|               | 月 日 ~ ( ) | コース目            | □調製可 □TEL連絡後調製 |                |    |                |
| 備考[標準投与量逸脱など] |           |                 | 放射線併用          | 【調製指示(2日目以降)】  |    |                |
|               |           |                 | □有 □無          | □調製可 □TEL連絡後調製 |    |                |

Day1 ( / )

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを  
治療開始前に服用

本管

生理食塩水 500mL

側管

(4-5hr)

開始時  
(30min)グラニセトン1mg/生食50mL  
デキサート6.6mg 1V  
デキサート3.3mg 1A  
(リン酸エステル換算 12mg)

全開で

生理食塩水 50mL

(10min)

生理食塩水 50mL  
カルセド mg

全開で

生理食塩水 50mL

(1hr)

生理食塩水 250mL  
カルボプラチン mg

全開で

生理食塩水 50mL

調製後3時間  
以内に投与  
終了する

Day2 ( / ) ~ Day3 ( / )

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを  
午前中(朝食後)に服用

本管

生理食塩水 250mL

側管

(1hr)

(30min)

グラニセトン1mg/生食50mL  
デキサート6.6mg 1V  
(リン酸エステル換算 8mg)

全開で

生理食塩水 50mL

(10min)

生理食塩水 50mL  
カルセド mg

全開で

生理食塩水 50mL

Day2は終了後へパロック

終了後へパロック

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 使用Cre値 | GFR算出式            |
| mg/dl  | □ Cockcroft-Gault |
| □ 補正あり | □ Jelliffe        |
| □ 補正なし | □ 24hrCcr         |
|        | □                 |

CBDCA+AMR療法

標準投与量:

|       |                      |        |
|-------|----------------------|--------|
| CBDCA | AUC=5                | day1   |
| AMR   | 35 mg/m <sup>2</sup> | day1-3 |
| 4週毎   |                      |        |