

非小細胞肺癌に対する NDP+AMR療法(臨床試験)

(アクプラ+カルセド)

DRPHW_DRPHW_1

2010年06月15日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示(初日)】		
	月	日 ~ ()	コース目	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(2日目以降)】		
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		

Day1 (/ /)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

生理食塩水 1,000mL 側管

(6hr)

開始時

(30min)

グラニセトロン1mg/生食50mL
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

全開で

生理食塩水 50mL

(10min)

生理食塩水 50mL
カルセド mg

全開で

生理食塩水 50mL

(2hr)

生理食塩水 500mL
アクプラ mg

全開で

生理食塩水 50mL

終了後へパロック

調製後3時間
以内に投与
終了する

Day2 (/ /) ~ Day3 (/ /)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

本管

生理食塩水 250mL 側管

(1.5hr)

(30min)

グラニセトロン1mg/生食50mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

全開で

生理食塩水 50mL

(10min)

生理食塩水 50mL
カルセド mg

全開で

生理食塩水 50mL

Day2は終了後へパロック

NDP+AMR療法

標準投与量:

NDP 100 mg/m² day1

AMR 25 mg/m² day1-3

4週毎