

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する R-CHOP療法

リツキシマブ+エンドキサン+ドキソルビシン+オンコビン+プレドニン

2008年05月13日 承認

2025年03月25日 改訂

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign


病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(2日目)】			
			□調製可 □TEL連絡後調製			

Day1 (/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポラミン錠	1錠	過敏反応
カロナール錠	500mg	防止の為

本管




※リツキシマブ投与速度

最初の1時間
↓ () mg/hr
次の1時間
↓ () mg/hr
以後
↓ () mg/hr

★10倍希釈の場合はmg = mL

Day2 (/)

本管



内服薬

プレドニン錠

★1日 mg

5日間 服用

R-CHOP療法

標準投与量:

R	375 mg/m ²	day1
CPA	750 mg/m ²	day2
ADM	50 mg/m ²	day2
VCR	1.4 mg/m ²	day2
	(max:2mg/body)	
PSL	100 mg/body	day2-6
		3-4週毎