

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する Pola-R-CHP(BW:40kg未満)療法

(ポライビー+リツキシマブ+エンドキサン+ドキシソルビシン+プレドニン) RPHW DRPHW

2022年09月26日 承認

2025年03月25日 改定

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(2日目)】			
			□調製可 □TEL連絡後調製			

※体重40kg未満

Day1(/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポラミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)

本管

× ()

側管

(15min)

生理食塩水 50mL
デキサート6.6mg 2V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 20mg)

※

生理食塩水 mL
リツキシマブ mg

10倍
希釈!

全開で

生理食塩水 50mL

※リツキシマブ投与速度

最初の1時間
↓ () mg/hr
次の1時間
↓ () mg/hr
以後
↓ () mg/hr

★10倍希釈の場合はmg = mL

※初回:90分で投与可
↓ (忍耐力良好)
以降:30分で投与可
↓

Day2(/)

《ポライビー投与30分前に服用》

ポラミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)

本管

× ()

側管

(15min)

グラニセトン1mg/生食50mL

※専用ルートで

全開で

生理食塩水 50mL
ポライビー mg

(1hr)

生理食塩水 100mL
ドキシソルビシン mg

(1.5hr)

生理食塩水 250mL
エンドキサン mg

全開で

生理食塩水 50mL

内服薬

プレドニン錠

★1日 mg
5日間 服用

Pola-R-CHP(BW:40kg未満)療法

標準投与量:

R	375 mg/m ²	day1
CPA	750 mg/m ²	day2
ADM	50 mg/m ²	day2
Pola	1.8 mg/kg	day2
PSL	100 mg/body	day2-6 3週毎