

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する Pola-R-CHP(BW:40kg以上)療法

(ポライビー+リツキシマブ+エンドキサン+ドキシソルビシン+プレドニン) RPHW DRPHW

2022年09月26日 承認

2025年03月25日 改定

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(2日目)】			
			□調製可 □TEL連絡後調製			

※体重40kg以上

Day1 (/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポラミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)

本管

× ()

側管

(15min)

生理食塩水 50mL
デキサート6.6mg 2V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 20mg)

※

生理食塩水 mL
リツキシマブ mg

10倍
希釈!

全開で

生理食塩水 50mL

※リツキシマブ投与速度

最初の1時間

↓ () mg/hr

次の1時間

↓ () mg/hr

以後

↓ () mg/hr

★10倍希釈の場合はmg = mL

※初回:90分で投与可

↓ (忍耐力良好)

以降:30分で投与可

↓

Day2 (/)

《ポライビー投与30分前に服用》

ポラミン錠 1錠 (過敏反応)
カロナール錠 500mg (防止の為)

本管

× ()

側管

(15min)

グラニセトロン1mg/生食50mL

※専用ルートで

全開で

生理食塩水 100mL
ポライビー mg

全開で

生理食塩水 50mL

(1hr)

生理食塩水 100mL
ドキシソルビシン mg

(1.5hr)

生理食塩水 250mL
エンドキサン mg

全開で

生理食塩水 50mL

内服薬

プレドニン錠

★1日 () mg

5日間 服用

Pola-R-CHP(BW:40kg以上)療法

標準投与量:

R 375 mg/m² day1CPA 750 mg/m² day2ADM 50 mg/m² day2

Pola 1.8 mg/kg day2

PSL 100 mg/body day2-6 3週毎