

非小細胞肺癌に対する CBDCA＋nab-PTX＋Dur＋Trem療法

(カルボプラチン＋アブラキサン＋イミフィンジ＋イジユド) RPHW_RPHW_1

2024年8月19日 承認		Dr.sign		Ns.sign		Ph.sign	
病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積	
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²	
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示】		
	月 日 ~ ()		コース目		□ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用		【調製指示(2回目以降)】		
			□ 有 □ 無		□ 調製可 □ TEL連絡後調製		

Day1(/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

本管

生理食塩水 500mL

側管1

全開で 生理食塩水 50mL

専用ルート (1hr) 生理食塩水 100mL
イジユド 75 mg

全開で 生理食塩水 50mL

専用ルート (1hr) 生理食塩水 100mL
イミフィンジ 1500 mg

全開で 生理食塩水 50mL

側管2

開始時 (15min) パロノセトロン 0.75mg/50mL
デキサート6.6mg 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 12mg)

一旦本管止め (30min) アブラキサン mg

※主管止めて単独投与

本管再開 (1.5hr) 生理食塩水 250mL
カルボプラチン mg

全開で 生理食塩水 50mL

終了抜去

Day2(/) ~ Day3(/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

Day8(/) ・ Day15(/)

本管

生理食塩水 100mL

側管

開始時 (10min) 生理食塩水 50mL
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

一旦主管止め (30min) アブラキサン mg

※主管止めて単独投与
で投与すること！！

全量 mL

本管再開 全開で 生理食塩水 50mL

終了抜去

※BW:30kg以下の場合
イミフィンジ:20mg/kg

CBDCA＋nab-PTX＋Dur＋Trem療法

標準投与量:

CBDCA AUC=6 day1

nab-PTX 100 mg/m² day1.8.15

Dur 1500 mg/body day1

※30kg以下の場合は20mg/kg

Trem 75 mg/body day1

3週毎

使用Cre値

GFR算出式

mg/dl

□ 補正あり

□ 補正なし

□ Cockcroft-Gault

□ Jelliffe

□ 24hrCcr