

非小細胞肺癌に対する CBDCA+PEM+Dur+Trem療法

(カルボプラチン+ペトレキセド+イミフィンジ+イジュド) RPHW DRPHW

2024年8月19日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示】	
	月	日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
備考[標準投与量逸脱など]						

【必須項目】

- 投与7日以上前からパナビタン末1g 1×服用開始
- 初回投与の少なくとも7日前にシアノコバラミン注 1A筋注

Day1 (/ /)

Day2 (/ /) ~ Day3 (/ /)


アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後)服用

本管

側管



【ペトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

- パナビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- シアノコバラミン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

※BW:30kg以下の場合
イミフィンジ:20mg/kg

CBDCA+PEM+Dur+Trem療法

標準投与量:

CBDCA AUC=5 day1
 PEM 500 mg/m² day1
 Dur 1500 mg/body day1
 ※30kg以下の場合20mg/kg
 Trem 75 mg/body day1

3週毎

使用Cre値	GFR算出式
mg/dl	<input type="checkbox"/> Cockcroft-Gault
<input type="checkbox"/> 補正あり	<input type="checkbox"/> Jelliffe
<input type="checkbox"/> 補正なし	<input type="checkbox"/> 24hrCcr
	<input type="checkbox"/>