

非小細胞肺癌に対する CDDP+PEM+Dur+Trem療法

(シスプラチン+ペトレキセド+イミフィンジ+イジユド) RPHW_DRPHW

2024年8月19日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	コース予定	<input type="checkbox"/> 調製可 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製 放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
備考[標準投与量逸脱など]						

【必須項目】


- 投与7日以上前からパンビタン末1g 1×服用開始
- 初回投与の少なくとも7日前にシアノコバラミン注 1A筋注

Day1 (/ /)

Day2 (/ /) ~ Day3 (/ /)

本管

本管



【ペトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

- パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- フレスミンS注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

**※BW:30kg以下の場合
イミフィンジ:20mg/kg**

CDDP+PEM+Dur+Trem療法

標準投与量:

CDDP	75 mg/m ²	day1
PEM	500 mg/m ²	day1
Durvalumab	1500 mg/body	day1
※30kg以下の場合20mg/kg		
Tremelimumab	75 mg/body	day1
3週毎		