

悪性リンパ腫(非ホジキン)に対する R-THP-COP療法

(リツキシマブ+テラルビシン+エンドキサン+オンコビン+プレドニン) RPHW DRPHW

2025年03月25日 改訂

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			【調製指示(2日目以降)】			
			□調製可 □TEL連絡後調製			

Day 1 (/)

《リツキシマブ投与30分前に服用》

ポララミン錠	1錠	過敏反応
カロナール錠	500mg	防止の為

本管

	× ()
--	-------

側管

生理食塩水	50mL
デキサート	6.6mg 2V
デキサート	3.3mg 1A
(リン酸エステル換算)	20mg

(15min)

生理食塩水	mL
リツキシマブ	mg

10倍
希釈!

生理食塩水	50mL
-------	------

全開で

※リツキシマブ投与速度

最初の1時間
↓ () mg/hr
次の1時間
↓ () mg/hr
以後
↓ () mg/hr

★10倍希釈の場合はmg = mL

Day 2 (/)

本管

	× ()
--	-------

側管

グラニセトン	1mg/生食50mL
--------	------------

(15min)

生理食塩水	50mL
オンコビン	mg

(10min)

生理食塩水	100mL
テラルビシン	mg

(60min)

生理食塩水	500mL
エンドキサン	mg

(2.5h)

生理食塩水	50mL
-------	------

全開で

内服薬

プレドニン錠

★1日 mg

5日間 服用

R-THP-COP療法

標準投与量:

R	375 mg/m ²	1day
THP	30 mg/m ²	1day
CPA	500 mg/m ²	1day
VCR	1 mg/m ²	1day
	(max:2mg/body)	
PSL	30 mg/m ²	5days
		3-4週毎