

胃癌に対する mFOLFOX6＋Nivolumab療法

(レボホリナート＋オキサリプラチン＋フルオロウラシル＋オブジーボ) RPHW_DRPHW_1

2021年12月20日 承認
2024年08月30日 改訂

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			☐ 有 ☐ 無			

Day1 (/)

本管(中心静脈ポート)

生理食塩水 100mL

側管

生理食塩水 50mL

全開で

専用ルート (30min)

生理食塩水 100mL
オブジーボ mg

(30min)

グラニセトロン1mg/生食50mL
アロカリス 1V
デキサート3.3mg 1A
(リン酸エステル換算 4mg)

同時投与

(2hr)

5%ブドウ糖 250mL
レボホリナート mg

(2hr)

5%ブドウ糖 250mL
オキサリプラチン mg

(全開でdiv)
(2分程度で)

生理食塩水 20mL※
フルオロウラシル mg

(全開でdiv)

生理食塩水 50mL

※ポート時 (46hr)

生理食塩水 140 mL
フルオロウラシル mg
★全量140mLに調製

(インフューザーポンプを使用)

終了後に自己抜針

(初回は本人及び家族に指導し、自己抜針してもらう)

Day2 (/) ~ Day3 (/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 4錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

mFOLFOX6＋Nivolumab療法

標準投与量:

Nivolumab	240 mg/body	day1
I-LV	200 mg/m ²	day1
L-OHP	85 mg/m ²	day1
5-FU	400 mg/m ²	(bolus)
5-FU	2,400 mg/m ²	(46hr持続)

2週毎