

乳癌に対する PER+Tmab(s.c)+wPTX療法

(フェスゴ+パクリタキセル)

DRPHW_DRPHW_1

2024年07月22日 承認

		Dr.sign	Ns.sign		Ph.sign	
病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル		【調製指示(初日)】	
	月 日 ~ ()コース目		コース予定		☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製	
アルコール過敏症	備考[標準投与量逸脱など]				【調製指示(2回目以降)】	
☐ なし ☐ あり(慎重投与)					☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製	
放射線併用						
☐ 有 ☐ 無						

Day1 ()

2mL/min以下の速度で
皮下注(8分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 IN (15mL)

※ 投与後 30分 経過観察

2コース目以降、Day1

2mL/min以下の速度で
皮下注(5分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 MA (10mL)


※ 投与後 30分 経過観察

※ インフュージョンリアクションない場合

⇒ 投与後 15分 経過観察 まで短縮可

※翼状針 禁！ ※22-27Gの注射針で投与 ※大腿部に

Day1・Day8・Day15



PER+Tmab(s.c)+weeklyPTX療法

標準投与量:

PTX 80 mg/m² day1,8,15
PER 600 mg/body day1
(初回のみ1200mg/body
Tmab 600 mg/body 4週毎