

乳癌に対する PER+Tmab(s.c)+GEM療法

(フェスゴ+ゲムシタビン)

)RPHW_D RPHW_I

20年月日 承認

Dr.sign

/

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	コース予定	【調製指示(初日)】		
	月 日 ~ ()コース目			☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(Day8)】		
			☐ 有 ☐ 無	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		

Day1(/)

2mL/min以下の速度で
皮下注(8分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 IN (15mL)

※ 投与後 30分 経過観察

2コース目以降、Day1

2mL/min以下の速度で
皮下注(5分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 MA (10mL)

※ 投与後 30分 経過観察

※ インフュージョンリアクションない場合

⇒ 投与後 15分 経過観察 まで短縮可

※翼状針 禁！

※22-27Gの注射針で投与

※大腿部に

Day1(/) ・ Day8(/)

本管

生理食塩水 100mL

側管

グラニセロン1mg/生食50ml
デキサート6.6mg 1V
(リン酸エステル換算 8mg)

(30min)

5%ブドウ糖 50mL
ゲムシタビン mg

(30min)

生理食塩水 50mL

全開で

終了抜去

PER+Tmb(s.c)+GEM療法

標準投与量:

GEM 1,000 mg/m² day1,8PER 600 mg/body day1
(初回のみ1200mg/body)

Tmab 600 mg/body 3週毎