

乳癌に対する PER+Tmab (s.c)+Eribulin療法

(フェスゴ+エリ布林)

DRPHW_DRPHW_1

2024年10月21日 承認
2025年3月13日 改訂

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示(初日)】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(2回目以降)】		
			☐ 有 ☐ 無	☐ 調製可 ☐ TEL連絡後調製		

初回Day1 (/)

2mL/min以下の速度で
皮下注(8分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 IN (15mL)

※ 投与後 30分 経過観察

2コース目以後、Day1

2mL/min以下の速度で
皮下注(5分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 MA (10mL)

※ 投与後 30分 経過観察



※ インフュージョンリアクションない場合

⇒ 投与後 15分 経過観察 まで短縮可


※翼状針 禁！

※22-27Gの注射針で投与

※大腿部に



Day8 (/)



PER+Tmab(s.c)+Eribulin療法

標準投与量:

Eribulin 1.4 mg/m² day1,8
PER 600 mg/body day1
(初回のみ1200mg /body
Tmab 600 mg/body 3週毎