

乳癌に対する PER+Tmab(s.c)+DTX療法

(フェスゴ+ドセタキセル)

DRPHW_DRPHW_1

2024年7月22日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>	様 <<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日		実施サイクル	【調製指示(初日)】		
	月	日 ~ ()	コース目	□調製可 □TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用	【調製指示(2回目以降)】		
			□有 □無	□調製可 □TEL連絡後調製		

初回Day1(/)

2mL/min以下の速度で
皮下注(8分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 IN (15mL)

※ 投与後 30分 経過観察

以後、Day1

2mL/min以下の速度で
皮下注(5分以上かけて)

フェスゴ配合皮下注 MA (10mL)

※ 投与後 30分 経過観察


※ インフュージョンリアクションない場合

⇒ 投与後 15分 経過観察 まで短縮可

※翼状針 禁！

※22-27Gの注射針で投与


※大腿部に



初回Day2(/) ~ Day3(/)

《治療翌日朝より2日間服用》

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用



Day2 ~ Day3

《治療翌日より2日間服用》

デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後) 服用

PER+Tmab(s.c)+DTX療法

標準投与量:

DTX 75 mg/m² day1

PER 600 mg/body

(初回のみ1200mg/body day1

HER 600 mg/body 3週毎