

非小細胞肺癌に対する【80kg以上】CBDCA+Pemetrexed+Amivantamab療法1コース目 (day1,2)

(カルボプラチン+ペメトレキセド+ライブリバント) <<ORIP>>RPHW

2025年01月20日 承認

Dr.sign

Ns.sign

Ph.sign

病棟・科名	登録番号 <<SYPID>>	氏名 <<ORIBP_KANJI>>	年齢 様 <<SYAGE>>	身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²
疾患名	施行予定日 月 日 ~ ()	コース目	実施サイクル コース予定	【調製指示】 <input type="checkbox"/> TEL連絡後調製		
備考[標準投与量逸脱など]				放射線併用 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

【必須項目】

- 投与7日以上前からパンビタン末1g 1×服用開始
- 初回投与の少なくとも7日前にシアノコバラミン注 1A筋注


Day1 (/)

アプレピタントカプセル125mg 1回 1Cを
治療開始前に服用

《カルボプラチン投与前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの
過敏反応防止のため

生理食塩水 500mL 本管



終了抜去

GFR算出式

使用Cre値 mg/dl

補正あり 補正なし

Cockcroft-Gault Jelliffe 24hrCcr

【ペメトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】

- パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- シアノコバラミン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

Day2 (/) ~ Day3 (/)

アプレピタントカプセル80mg 1回 1Cを
午前中(朝食後)に服用

day3のみ


デカドロン錠 1回 8錠を
1日2回(朝昼食後)服用

Day2 (/)

《ライブリバント投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの
過敏反応防止のため

生理食塩水 500mL 本管



終了抜去

※ライブリバント投与速度

day1 50mL/hr → 75mL/hr } 投与開始から2時間後、速度UP可
day2 25mL/hr → 50mL/hr } (infusion reactionない場合)

CBDCA+PEM+Amivantamab療法

標準投与量

CBDCA	AUC=5	day1
PEM	500 mg/m ²	day1
Amivan	350 mg/body	day1
	1400 mg/body	day2
	1750 mg/body	day8,15
		3週毎