

非小細胞肺癌に対する【80kg以上】CBDCA+Pemetrexed+Amivantamab療法 1コース目 (day8,15)

(カルボプラチン+ペメトレキセド+ライブリバント) <<ORIP>>RPHW_1

2025年01月20日 承認

Dr.signNs.signPh.sign


病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>>様	<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()	コース目	□ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			□ 有 □ 無			

Day8(/)

Day15((/)

《ライブリバント投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの過敏反応防止のため



- 【ペメトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】
- (1) パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。
- (2) シアノバリン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

CBDCA+PEM+Amivantamab療法				
標準投与量				
CBDCA	AUC=5	day1		
PEM	500	mg/m ²	day1	
Amivan	350	mg/body	day1	
	1400	mg/body	day2	
	1750	mg/body	day8,15	
			3週毎	