

非小細胞肺癌に対する【80kg以上】CBDCA+Pemetrexed+Amivantamab療法 1コース目 (day8,15)

(カルボプラチン+ペメトレキセド+ライブリバント) <<ORIP>>RPHW\

2025年01月20日 承認

Dr.signNs.signPh.sign


病棟・科名	登録番号	氏名	年齢	身長	体重	体表面積
	<<SYPID>>	<<ORIBP_KANJI>> 様	<<SYAGE>>	cm	kg	m ²
疾患名	施行予定日	実施サイクル	【調製指示】			
	月 日 ~ ()コース目	コース予定	☐ TEL連絡後調製			
備考[標準投与量逸脱など]			放射線併用			
			☐ 有 ☐ 無			

Day8(/)

Day15(/)

《ライブリバント投与60分前に服用》

カロナール錠(500) 2T ライブリバントの過敏反応防止のため



- 【ペメトレキセドの投与終了(中止)時の注意事項】
- (1) パンビタン末は、最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。

(2) シアノバラン注は、投与期間中および投与中止後22日目まで9週ごと(3コースごと)に1回投与する。

CBDCA+PEM+Amivantamab療法				
標準投与量				
CBDCA	AUC=5	day1		
PEM	500 mg/m ²	day1		
Amivan	350 mg/body	day1		
	1400 mg/body	day2		
	1750 mg/body	day8,15		
		3週毎		